

28 ИЮЛЯ



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

ПРОФИЛАКТИКА



соблюдайте
правила
личной
гигиены



кипятите
воду



предохраняйтесь
при половых
контактах



перевязывайте
любые порезы
или открытые
раны



сделайте
прививку
для
профилактики
гепатитов
A, B (D)



татуировки
и пирсинг
должны
производиться
только
стерильным
оборудованием

Иммунизация против гепатита А проводится двукратно,
с интервалом в 6-12 месяцев - сформированный иммунитет
обеспечит защиту от заболевания до 15 лет.

«Это ГЕПАТИТ...

Знайте о нём. Защищайтесь от него»



Министерство здравоохранения
Калининградской области
ГБУ «Центр общественного
здравия и медицинской профилактики»




Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Калининградской области

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ



причины
симптомы
профилактика



Вирусный гепатит – инфекционное воспаление ткани печени, вызываемое вирусами. Существует 7 основных вирусов гепатита, из которых чаще всего встречаются А, В, С и Е, также причиной гепатитов могут быть и другие инфекции или токсичные вещества (например, алкоголь и некоторые наркотики). Перенесённое заболевание одним из вирусных гепатитов не исключает возможности заражения любым другим. Два из них – гепатит А и гепатит Е – относятся к кишечным инфекциям, а гепатиты группы В и С рассматриваются как кровяные инфекции.

Острая инфекция протекает с такими симптомами, как, утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.

Способы заражения



Через загрязнённую воду

A,
E



При половых контактах

B,
C



Через зараженные пищевые продукты

A,
E



От матери ребёнку

B,
C,
E



При переливании заражённой крови, использовании грязных игл

B,
C,
E

Часто гепатит протекает бессимптомно на протяжении целых десятилетий до тех пор, пока не разовьётся хроническая болезнь печени. По этой причине сегодня в мире наблюдается так называемая «скрытая эпидемия» заболевания гепатитом.

ПРИВИВКА ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА <>B> ВКЛЮЧЕНА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК И ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА



Вирусный гепатит А (инфекционный гепатит, болезнь Боткина) относится к числу наиболее распространенных в мире кишечных инфекций, вызываемых вирусом (болезнь «грязных рук»). Возбудитель внедряется через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, затем проникает в лимфатические узлы и печень и повреждает клетки печени.

СИМПТОМЫ

(характерны для всех форм гепатита):

лихорадка, головная боль, боль в животе, рвота, позднее – темное окрашивание мочи (становится «цвета пива»), обесцвечивание кала, тупые боли в правом подреберье.

Разгар болезни сопровождается желтухой – желтым окрашиванием склер (белков глаз), слизистой оболочки полости рта и кожи. Частота желтушных форм увеличивается с возрастом, желтуха редко встречается у детей до 5 лет и является практически обязательным спутником гепатита А у взрослых.

После перенесения вирусного гепатита А развивается пожизненный иммунитет.

Гепатиты В, С и D (парентеральные вирусные гепатиты). Источником инфекции является человек – больной острой, хроническим гепатитом или носитель вируса, у которого клинические проявления заболевания отсутствуют. Вирус содержится во всех биологических жидкостях источника инфекции: крови, сперме, вагинальном секрете (меньше – в слюне, моче, грудном молоке, поте). Для заражения достаточно мельчайшей капли крови.

Острая инфекция у части больных переходит в носительство либо в хронический гепатит.

Развитие цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – итог длительного нахождения вируса в организме человека.